

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

В.И. Заляпин

Южно-Уральский государственный университет
454080, Челябинск, пр. Ленина 76,
механико-математический факультет,
(351)-267-9904, e-mail: vyal@susu.ac.ru

I. Рассмотрим случайное блуждание ξ в \mathbb{R}^{n+k} , задаваемое однородной переходной функцией

$$P\{x, y\} = P\{0, x - y\} = \begin{cases} p_i & x - y = e_i \\ 0 & x - y \neq e_i \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n + k, \quad (1)$$

где e_i – система базисных ортов. Рандомизуем это случайное блуждание пуассоновским процессом, параметр которого без ограничения общности можно считать равным единице.

Пусть $A = (a_{ij})$, $i = 1, 2, \dots, k$, $j = 1, 2, \dots, n + k$ – матрица с целочисленными элементами, $m \in \mathbb{R}^k$ – целочисленный вектор. Положим $x \sim y \Leftrightarrow \exists m : x - y = mA$. Обозначим через $\mathcal{R}_n^k(A)$ совокупность классов эквивалентности $\mathcal{H}_y(A) = \{x \in \mathbb{R}^{n+k} : \exists m : x = y + mA\}$.

Случайное блуждание (1) индуцирует случайное блуждание в $\mathcal{R}_n^k(A)$, при этом

$$P\{\xi \in \mathcal{H}_y(A)\} = e^{-t}\mathcal{G}_y(tp), p = \{p_1, \dots, p_{n+k}\}.$$

Здесь $\mathcal{G}_y(z)$ – функции пуассоновского блуждания (Ф.П.Б.) [1].

II. Рассмотрим группу комплексных матриц \mathcal{T} с элементами

$$t(\varphi, z) = \begin{pmatrix} e^{-\varphi} & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь $e^{-\varphi}$ – диагональная матрица с элементами $e^{-\varphi_i}, i = 1, 2, \dots, n + k$, $A\varphi = 0$, $z \in \mathbb{C}^{n+k}$ – вектор-столбец.

III. Примеры. 1). $A = (1, 1)$, Ф.П.Б. – модифицированные функции Бесселя, группа \mathcal{T} – группа гиперболических движений плоскости \mathbb{C}^2 .

2). $A = (1, 1, \dots, 1)$, Ф.П.Б. – функции Люстерника (обобщенные цилиндрические функции), группа \mathcal{T} – группа сверхгиперболических движений \mathbb{C}^{n+1} .

Список литературы

- [1] Заляпин, В.И. О системе функций пуассоновского блуждания./Заляпин В.И., Люстерник Л.А.//ДАН СССР.–1972.– Т.207, №1. С.29-31